

# Neselektivní herbicidy



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Roundup® Biaktiv Pro ..... | 148 |
| Roundup® Dynamic .....     | 154 |
| Roundup® Klasik Pro .....  | 160 |

# Roundup® Biaktiv Pro

## Účinné látky

glyfosát 450 g/l (ve formě draselné soli 551 g/l)

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby

Postřikový herbicid ve formě kapalného rozpuštěného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoní, vinnohradech, k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách, v lesních kulturách, k likvidaci pobřežních plevelů a nežádoucích dřevin.

## Balení a hmotnost

HDPE láhev 1 l, HDPE kanystr 20 l  
(v kartonu 12 × 1 l, paleta 32 × 20 l)

## Působení přípravku

Roundup® Biaktiv Pro je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddenky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně kořenového systému (HRAC/WSSA skupina 9). Působením přípravku v rostlině se docílí zničení jejích podzemních i nadzemních částí. Vzhledem k tomu, že Roundup® Biaktiv Pro je na povrchu půdy okamžitě inaktivován a mikrobiálně odbouráván, neproniká půdou ke kořenům a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhnědnutí zasažených rostlin. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 2 hodin po ošetření účinek snižuje. Kultivační a setové práce se mohou provádět v době, kdy se projeví první příznaky účinku.



**Roundup®**  
**Biaktiv Pro**

## Odstup srážek od aplikace

6 hodin (postřiková kapalina musí zaschnout na listech plevelů).

## Spektrum účinnosti

Roundup® Biaktiv Pro je totální neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddenky.

## Doporučení pro aplikaci

### Ovocné sady a vinnice

Jádroviny, réva vinná, peckoviny (kromě broskvoní)

Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6 l/ha po nasazení poupat. Opakovaná aplikace do max. 6,4 l/ha za vegetační sezónu. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevele. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.

### Dřeviny v sadech, alejích a jiných porostech

Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4% vodním roztokem.

## Lesní hospodářství

### Lesní školky

Citlivost plevelů, které nejsou uvedené v rozhodnutí o povolení přípravku, nebyla vyhodnocena UKZÚZ z hlediska účinnosti, ale vyplývá ze zkušeností dosavadní agronomické praxe.



# Roundup® Biaktiv Pro

Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předsetová aplikace před sítí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkováními sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 2,5 l/ha koncem srpna nebo začátkem září po vyžrání letorostů. Pokud je nezbytné nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

## Lesní porosty

V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyžrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).

Aplikace během vegetačního období jehličnaných dřevin nebo aplikace v listnatých dřevinách je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,5 l/ha. Na přesličku rolní Roundup® Biaktiv Pro nepůsobí.

## Prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti)

K potlačení zmlazování pařezů se používá náter (15% roztok) nebo postřik pařezů 4% vodným roztokem ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4% vodným roztokem.

## Chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa

Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,5 l/ha.

## **Orná půda**

### Před setím nebo sázením plodin

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele před setím nebo výsadbou plodin jako jsou brambory, sója, kukuřice, slunečnice, cukrová řepa apod.

### Po sklizni kulturních plodin

Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3–4 listy.

## **Jahodník**

V jahodníku se přípravek aplikuje proti přerostlým plevelům speciálním knotovým rámem, použije se dávka 1–1,5 l přípravku/ha a ředí se na koncentraci 25–40 %. Ošetřuje se pouze po sklizni.

## **Louky a pastviny**

### Obnova trvalých travních porostů

Dávka se řídí plevelným druhem, stupněm zaplevelení a vzrůstem plevelů. Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 5 l/ha.

**Omezení:** zákaz spásání nebo zkrmování hospodářskými zvířaty



# Roundup® Biaktiv Pro

## Zavlažovací kanály

### Nežádoucí dřeviny, pobřežní plevely

Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v období aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevely nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

### **Nezemědělská půda**

#### Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů

Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

## Nežádoucí vegetace

Roundup® Biaktiv Pro lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnicích, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

## Železnice

Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června.

## Příprava postřikové kapaliny

Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do dvou třetin vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem.

## Technika postřiku

Přípravek lze aplikovat postřikem schválenými postřikovači, nátěrem nebo knotovým rámem. Při aplikaci doporučujeme použít dávku vody 100–400 l/ha. Postřik provádějte jen za bezvětří, nebo mírného vánku, v tomto případě ve směru po větru od dalších osob. Pro aplikaci v dalších plodinách je nutno postřikovač řádně vyčistit způsobem uvedeným v etiketě. Při ošetřování (např. lesy, aleje, podél silnic a cest apod.) v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření:

- aplikaci je vhodné předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);
- přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše;
- doporučujeme po dobu aplikace a až do zasnění postřiku zamezit (popř. omezit) vstup osob a pohybům zvířat na ošetřené ploše;
- je-li to možné, je vhodné po dobu aplikace přípravku objekt uzavřít;
- opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zasnění postřiku.

**Přípravkem, ani jeho úletem, nesmějí být zasazeny žádné rostliny a jejich společenstva, která nejsou určena k likvidaci.**



# Roundup® Biaktiv Pro

## Návod k použití

| Plodina                                               | Škodlivý organizmus                                  | Dávkování                      | OL (dny) | Poznámka k<br>1) plodině<br>2) ŠO<br>3) OL<br>4) dávkování                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sady ovocné, aleje a jiné porosty                     | likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti     | 4 % roztok                     | AT       |                                                                                       |
| Jahodník                                              | plevele přerostlé                                    | 1–1,5 l/ha<br>(25–40 % roztok) | AT       |                                                                                       |
| Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva vinná      | pýr plazivý, pcháč, mléč                             | 2,5–4 l/ha                     | AT, 14   | 3) AT pro jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, OL 14 dnů pro révu<br>4) max. 2× za rok |
| Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva vinná      | svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá | 6 l/ha                         | AT, 14   | 3) AT pro jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, OL 14 dnů pro révu<br>4) max. 1× za rok |
| Lesní hospodářství-prořezávky a probírky              | hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti      | 15 % nátěr, 4 % postřik        | AT       | 4) max. 1×                                                                            |
| Lesní hospodářství, chemická příprava pro obnovu lesa | plevele, nežádoucí dřeviny                           | 2,5–5,5 l/ha                   | AT       | 4) max. 1× za rok                                                                     |
| Lesní hospodářství-lesní porosty                      | plevele, nežádoucí dřeviny                           | 2,5–5,5 l/ha                   | AT       | 4) max. 2× za rok                                                                     |



# Roundup® Biaktiv Pro

| Plodina                              | Škodlivý organizmus                                                               | Dávkování                             | OL (dny) | Poznámka k<br>1) plodině<br>2) ŠO<br>3) OL<br>4) dávkování |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Lesní hospodářství-<br>-lesní školky | buřeň                                                                             | 2,5–4 l/ha                            | AT       | 4) max. 1× za rok                                          |
| Louky, pastviny                      | obnova TTP                                                                        | 2,5–5 l/ha                            | 21       |                                                            |
| Nezemědělská půda                    | nežádoucí vegetace                                                                | 2,5–5 l/ha<br>max. 300 l<br>vody/ha   | AT       | 4) max. 2× za rok                                          |
| Nezemědělská půda                    | boříševník velkolepý,<br>křídlatka sachalinská,<br>plevele – expandující<br>druhy | 5,5–6,4 l/ha<br>300–400 l<br>vody/ha  | AT       | 4) aplikace plošná,<br>max. 1× za rok                      |
| Nezemědělská půda                    | boříševník velkolepý,<br>křídlatka sachalinská,<br>plevele – expandující<br>druhy | 4 % roztok                            |          | 4) aplikace bodová,<br>max. 1× za rok                      |
| Orná půda                            | pýr plazivý,<br>plevele vytrvalé                                                  | 2,5–4 l/ha<br>100–150 l<br>vody/ha    | AT       | 1) před setím,<br>před výsadbou<br>4) max. 1× za rok       |
| Orná půda                            | pýr plazivý,<br>plevele vytrvalé                                                  | 2,5–4 l/ha<br>max. 200 l<br>vody/ha   | AT       | 1) po sklizni<br>4) max. 1× za rok                         |
| Orná půda                            | plevele jednoleté                                                                 | 1,5–2,5 l/ha<br>100–150 l<br>vody/ha  | AT       | 1) před setím,<br>před výsadbou<br>4) max. 1× za rok       |
| Orná půda                            | plevele jednoleté                                                                 | 1,5–2,5 l/ha<br>max. 200 l<br>vody/ha | AT       | 1) po sklizni<br>4) max. 1× za rok                         |



# Roundup® Biaktiv Pro

| Plodina            | Škodlivý organismus                      | Dávkování              | OL (dny) | Poznámka k<br>1) plodině<br>2) ŠO<br>3) OL<br>4) dávkování |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Zavlažovací kanály | plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny      | 4 l/ha                 | AT       |                                                            |
| Železnice          | nežádoucí vegetace<br>nežádoucí vegetace | 4–6,4 l/ha<br>3,2 l/ha | AT<br>AT | 4) max. 1× za rok<br>4) max. 2× za rok                     |

OL - ochranná lhůta je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní;

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

(-) - ochrannou lhůtu není nutno stanovovat



# Roundup® Dynamic

## Účinné látky

glyfosát 500 g/l (ve formě draselné soli 613 g/l)

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby

**Neselektivní herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoní, vinnohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.**

## Balení a hmotnost

HDPE láhev 1 l, HDPE kanystr 5 l, 20 l,  
HDPE kontejner 640 l

## Působení přípravku

Roundup® Dynamic je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny (HRAC/WSSA skupina 9). Touto translokací se docílí zničení i podzemních orgánů odolných vytrvalých plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko kořenících plevelů je vytvoření dostatečné listové plochy v době aplikace, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupatek do odkvětu, kdy rostliny jsou v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhnědnutí zasažených rostlin během 10–14 dnů. Za chladného a suchého počasí se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu.

## Odstup srážek od aplikace

1 hodina (postřiková kapalina musí zaschnout na listech plevelů). Srážky v období po aplikaci zvyšují působení herbicidu.

## Spektrum účinnosti

Roundup® Dynamic je totální neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddenky.



**Roundup®  
Dynamic**

## Doporučení pro aplikaci

### Sady ovocné, aleje a jiné porosty

Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po řezu kmínků.

Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4% vodným roztokem.

### Jahodník

V jahodníku se přípravek aplikuje proti přerostlým plevelům speciálním knotovým rámem, použije se dávka 0,9–1,3 l přípravku/ha a ředí se na koncentraci 22–36 %. Ošetřuje se pouze po sklizni.

### Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva vinná

Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 5,4 l/ha po nasazení poupatek. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.

### Lesní hospodářství - prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti)

K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr pařezů nebo postřik pařezů 4% vodným roztokem ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mizy. Ošetření pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4% vodným roztokem.





## **Lesní hospodářství - chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa**

Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem bušeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,0 l/ha.

### **Lesní porosty**

V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyžrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 2,2 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).

Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s krytými tryskami.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem bušeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,0 l/ha. Na přesličku rolní přípravek nepůsobí.

### **Lesní školky**

Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předsetová aplikace před sítí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkováními sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 2,2 l/ha koncem srpna nebo začátkem září po vyžrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jednalo-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

### **Louky a pastviny (obnova trvalých travních porostů)**

Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 4,5 l/ha. Zákaz spásání nebo zkrmování hospodářskými zvířaty.

## **Nezemědělská půda**

Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů

Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

### **Nežádoucí vegetace**

Přípravek lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na cestíčkách parků, hřbitovů, chodníků, parkovištích, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

### **Orná půda**

Po sklizni kulturních plodin

Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3–4 listy.

Před setím nebo sázením plodin

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele před setím nebo výsadbou plodin jako jsou brambory, sója, kukuřice, slunečnice, cukrová řepa apod.

### **Zavlažovací kanály**

Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v období aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevele. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

### **Železnice**

Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června.

### **Příprava postřikové kapaliny**

Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže aplikátoru naplněného do dvou třetin vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem.



## Technika postřiku

Přípravek lze aplikovat postřikem schválenými postřikovači, nátěrem nebo knotovým rámem. Při aplikaci doporučujeme použít dávku vody 100–400 l/ha. Postřik provádějte jen za bezvětří, nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Pro aplikaci v dalších plodinách je nutno postřikovač řádně vyčistit způsobem uvedeným v etiketě.

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

**Přípravkem, ani jeho úletem, nesmějí být zasaženy žádné rostliny a jejich společenstva, která nejsou určena k likvidaci.**

## Návod k použití

| Plodina                                        | Škodlivý organismus                                               | Dávkování                          | OL (dny) | Poznámka k<br>1) plodině<br>2) ŠO<br>3) OL<br>4) dávkování                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sady ovocné, aleje a jiné porosty              | Likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, hubení výmladků | 4 %                                | AT       |                                                                                               |
| Jahodník                                       | Plevele přerostlé                                                 | 0,9–1,3 l/ha<br>(23–36 % roztok)   | AT       | 1) po sklizni                                                                                 |
| Orná půda                                      | Plevele jednoleté                                                 | 1,3–2,2 l/ha<br>100–150 l vody /ha | AT       | 1) před výsadbou<br>4) max. 1× za rok                                                         |
| Orná půda                                      | Pýr plazivý, plevle vytrvalé                                      | 2,2–3,6 l/ha<br>200 l vody/ha      | AT       | 1) před výsadbou<br>4) max. 1× za rok                                                         |
| Jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná | Pýr plazivý, pcháč, mléč                                          | 2,2–3,6 l/ha                       | 14 AT    | 3) OL 14 dnů pro révu, OL AT pro jádroviny a peckoviny<br>4) max. 2× za rok, do max. 5,7 l/ha |
| Jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná | Svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá              | 5,4 l/ha                           | 14 AT    | 3) OL 14 dnů pro révu, OL AT pro jádroviny a peckoviny<br>4) max. 1× za rok                   |



# Roundup® Dynamic

| Plodina                                                                                                           | Škodlivý organizmus                                                           | Dávkování                              | OL (dny) | Poznámka k<br>1) plodině<br>2) ŠO<br>3) OL<br>4) dávkování                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lesní hospodářství<br>- prořezávky a probírky                                                                     | Hubení výmladků,<br>potlačení pařezové<br>výmladnosti                         | 4 %                                    | --       | 4) max. 1x                                                                                                                        |
| Lesní hospodářství -<br>chemická příprava pro<br>obnovu lesa                                                      | Plevele,<br>nežádoucí dřeviny                                                 | 2,2–5,0 l/ha                           | --       | 4) max. 1x za rok                                                                                                                 |
| Lesní hospodářství<br>- lesní porosty                                                                             | Plevele,<br>nežádoucí dřeviny                                                 | 2,2–5,0 l/ha                           | --       | 4) max. 2x za rok,<br>do max. 5,7 l/ha                                                                                            |
| Lesní hospodářství<br>- lesní školky                                                                              | Buřeň                                                                         | 2,2–3,6 l/ha                           | --       | 4) max. 1x za rok                                                                                                                 |
| Louky, pastviny                                                                                                   | Obnova TTP                                                                    | 2,2–4,5 l/ha                           | 21       | 4) max. 2x za rok,<br>do max. 6 l/ha                                                                                              |
| Nezemědělská půda<br>(cestičky hřbitovů, parků,<br>chodníky, parkoviště,<br>skladovací plochy, areály<br>podniků) | Nežádoucí<br>vegetace                                                         | 2,2–4,5 l/ha<br>max. 300 l<br>vody /ha | --       | 4) max. 2x za rok,<br>do max. 5,7 l/ha                                                                                            |
| Nezemědělská půda                                                                                                 | Bolševník velkolepý,<br>křídlatka sachalinská, plevele -<br>expandující druhy | 4,9–5,7 l/ha<br>300–400 l<br>vody /ha  | --       | 1) kde se běžně nepředpo-<br>kládá vstup široké veřejnosti<br>a zranitelných skupin osob<br>4) max. 1x za rok,<br>aplikace plošná |
| Nezemědělská půda                                                                                                 | Bolševník velkolepý,<br>křídlatka sachalinská, plevele -<br>expandující druhy | 4 %                                    | --       | 1) kde se běžně nepředpo-<br>kládá vstup široké veřejnosti<br>a zranitelných skupin osob<br>4) max. 1x za rok,<br>bodová aplikace |



ROUNDUP® DYNAMIC

Citlivost plevelů, které nejsou uvedené v rozhodnutí o povolení přípravků, nebyla vyhodnocena ÚKZÚZ z hlediska účinnosti, ale vyplývá ze zkušeností dosavadní agronomické praxe.

# Roundup® Dynamic

| Plodina            | Škodlivý organizmus                    | Dávkování                              | OL (dny) | Poznámka k<br>1) plodině<br>2) ŠO<br>3) OL<br>4) dávkování |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Orná půda          | Pýr plazivý,<br>plevele vytrvalé       | 2,2–3,6 l/ha<br>max. 200 l<br>vody /ha | AT       | 1) po sklizni<br>4) max. 1× za rok                         |
| Orná půda          | Plevele jednoleté                      | 1,3–2,2 l/ha<br>max. 200 l<br>vody /ha | AT       | 1) po sklizni<br>4) max. 1× za rok                         |
| Zavlažovací kanály | Plevele pobřežní,<br>nežádoucí dřeviny | 3,6 l/ha                               | --       |                                                            |
| Železnice          | Nežádoucí<br>vegetace                  | 3,6–5,7 l/ha                           | --       |                                                            |

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní



# Roundup® Dynamic

| Plodina, oblast použití                                                                               | Dávka vody    | Způsob aplikace                                      | Max. počet aplikací v plodině                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sady ovocné, aleje                                                                                    |               | nátěr, postřik                                       | 1× za rok                                                              |
| Jahodník                                                                                              |               | aplikace knotovým rámem                              | 1× za rok                                                              |
| Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva vinná                                                      | max. 200 l/ha | postřik                                              | 2× za rok, při opakované aplikaci do max. 5,7 l/ha za vegetační sezónu |
| Lesní hospodářství                                                                                    | 200 l/ha      | postřik, nátěr (nátěr pouze u prořezávek a probírek) | 2× za rok, při opakované aplikaci do max. 5,7 l/ha za vegetační sezónu |
| Louky, pastviny                                                                                       | max. 200 l/ha | postřik                                              | 2× za rok, při opakované aplikaci do max. 5,7 l/ha za vegetační sezónu |
| Nezemědělská půda (cestičky hřbitovů, parků, chodníky, parkoviště, skládovací plochy, areály podniků) | 300–400 l/ha  | postřik                                              | 2× za rok, při opakované aplikaci do max. 5,7 l/ha za vegetační sezónu |
| Orná půda                                                                                             | max. 200 l/ha | postřik                                              | 2× za rok, při opakované aplikaci do max. 5,7 l/ha za vegetační sezónu |
| Zavlažovací kanály                                                                                    | 200–300 l/ha  | postřik                                              | 1× za rok                                                              |
| Železnice                                                                                             | max. 300 l/ha | postřik                                              | 1× za rok                                                              |



ROUNDUP® DYNAMIC

Citlivost plevelů, které nejsou uvedené v rozhodnutí o povolení přípravků, nebyla vyhodnocena ÚKZÚZ z hlediska účinnosti, ale vyplývá ze zkušeností dosavadní agronomické praxe.

# Roundup® Klasik Pro

## Účinné látky

glyfosát 360 g/l  
(ve formě draselné soli 441 g/l)

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby

**Postřikový neselektivní herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednolétých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoni, vinnohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.**

## Balení a hmotnost

HDPE láhev 1 l  
HDPE kanistr 5 l, 20 l  
HDPE kontejner 640 l a 1000 l

## Působení přípravku

Roundup® Klasik Pro je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny (HRAC/ WSSA skupina 9). Touto translokací se docílí zničení i podzemních orgánů odolných vytrvalých plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko kořenících plevelů je vytvoření dostatečné listové plochy v době aplikace, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy rostliny jsou v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhnědnutí zasažených rostlin během 10–14 dnů. Za chladného a suchého počasí se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se doporučuje provádět až v době, kdy se plně projeví příznaky účinku.

## Odstup srážek od aplikace

4–6 hodin (postřiková kapalina musí zaschnout na listech plevelů). Srážky v období po aplikaci zvyšují působení herbicidu.

## Spektrum účinnosti

Roundup® Klasik Pro je totální neselektivní listový



**Roundup®**  
**Klasik Pro**

herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddenky.

## Doporučení pro aplikaci

### Ovocné sady a vinice

Jádroviny, réva vinná, peckoviny (kromě broskvoni)  
Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 7,5 l/ha po nasazení poupat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.

### Dřeviny v sadech, alejích a jiných porostech

Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po řezu kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodným roztokem.

### Orná půda

#### Po sklizni kulturních plodin

Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3–4 listy.

#### Před setím nebo sázením plodin

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele před setím nebo výsadbou plodin jako jsou brambory, sója, kukurice, slunečnice, cukrová řepa apod.

### Jahodník

V jahodníku se přípravek proti přerostlým plevelům aplikuje speciálním knotovým rámem, použije se dávka 1–2 l přípravku na ha a ředí se na koncentraci 33–50 %. Ošetřuje se pouze po sklizni.



# Roundup® Klasik Pro

## Louky a pastviny

### Obnova trvalých travních porostů

Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6 l/ha.

## Zavlažovací kanály

Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v období aplikace. Proti svlažci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poutat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

## Železnice

Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června na plevelu ve fázi BBCH 15–79.

## Nezemědělská půda

### Nežádoucí vegetace

Roundup® Klasik Pro lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnicích, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů

Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

## Lesní hospodářství

### Lesní školky

Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předsetová aplikace před sítí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovánými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 3 l/ha koncem srpna nebo začátkem září po vyžrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

### Lesní porosty

V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při

aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyžrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).

Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysky.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7 l/ha. Na přesličku rolní Roundup® Klasik Pro nepůsobí.

### Prořezávky a probírky

Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodným roztokem. K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr (15% roztok) nebo postřik (5% roztok) pařezů ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků.

### Lesní půda, chemická příprava pro obnovu lesa

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7 l/ha.

## Invazní dřeviny

(pajasan žláznatý, trnovník akát, javor jasanolistý a javor pensylvánský)

Aplikace se provádí ve vegetačním období, u dospělých stromů od doby po odkvětu do podzimu (do prvních mrazů), tedy přibližně od června do října (včetně), u malých stromků od konce dubna do října (včetně). U pajasanu žláznatého je nutné používat neředěný přípravek, jinak nedojde k dostatečnému zasažení kořenového systému, u ostatních dřevin by neměla být koncentrace roztoku nižší než 50 %. Potřebné množství aplikovaného přípravku u stromů do tloušťky do 20 cm zhruba odpovídá tloušťce ošetřovaného stromu, tj. strom o tloušťce kmene 10 cm vyžaduje cca 10 ml přípravku. U silných stromů od 20 cm výše je potřeba aplikovat dvojnásob



# Roundup® Klasik Pro

bek tloušťky kmene, tj. strom silný 25 cm vyžaduje cca 50 ml přípravku. Likvidaci je možno uvedeným způsobem provádět v porostech dřevin na veřejně přístupných plochách, na nezemědělské půdě, v lesních porostech, sadech, vinicích, zahradách a na železnici.

## Příprava postřikové kapaliny

Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do dvou třetin vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem.

## Technika postřiku

Přípravek lze aplikovat postřikem schválenými postřikovači, nátěrem nebo knotovým rámem. Při aplikaci doporučujeme použít dávku vody 100–300 l/ha. Postřik provádějte jen za bezvětří, nebo mírného vánku ve směru po větru a od dalších osob. Pro aplikaci v dalších plodinách je nutno postřikovač řádně vyčistit způsobem uvedeným v etiketě.

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Při ošetřování porostů na nezemědělské půdě nebo lesních porostů v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření:

- po dobu aplikace a až do zaschnutí postřiku zamezit (popř. omezit) vstup a pohyb osob na ošetřené ploše
- je-li to možné, je vhodné po dobu aplikace přípravku objekt uzavřít
- vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.

**Přípravkem, ani jeho úletem, nesmějí být zasaženy žádné rostliny a jejich společenstva, která nejsou určena k likvidaci.**

## Návod k použití

| Plodina                                              | Škodlivý organizmus                                          | Dávkování                         | OL (dny)  | Poznámka k<br>1) plodině<br>2) ŠO<br>3) OL<br>4) dávkování                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jádroviny,<br>peckoviny mimo broskvoň,<br>réva vinná | Pýr plazivý, pcháč,<br>mléč                                  | 3–5 l/ha<br>max. 200 l<br>vody/ha | AT,<br>14 | 3) OL 14 pro révu vinnou,<br>OL AT pro jádroviny,<br>peckoviny mimo broskvoň<br>4) max. 2× za rok |
| Jádroviny,<br>peckoviny mimo broskvoň,<br>réva vinná | Svlačec rolní, pam-<br>peliška lékařská,<br>kopřiva dvoudomá | 7,5 l/ha<br>max. 200 l<br>vody/ha | AT,<br>14 | 3) OL 14 pro révu vinnou<br>OL AT pro jádroviny,<br>peckoviny mimo broskvoň<br>4) max. 1× za rok  |
| Sady ovocné, aleje,<br>jiné porosty                  | Likvidace pařezů,<br>potlačení pařezové<br>výmladnosti       | 5 %                               | AT        |                                                                                                   |
| Orná půda                                            | Plevele jednoleté                                            | 2–3 l/ha<br>100–150 l<br>vody/ha  | AT        | 1) před setím, před výsadbou<br>4) max. 1× za rok                                                 |





# Roundup® Klasik Pro

| Plodina                           | Škodlivý organismus                                                    | Dávkování                      | OL (dny) | Poznámka k<br>1) plodině<br>2) ŠO<br>3) OL<br>4) dávkování |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Orná půda                         | Pýr plazivý, plevle vytrvalé                                           | 3–5 l/ha<br>100–150 l vody/ha  | AT       | 1) před setím, před výsadbou<br>4) max. 1× za rok          |
| Orná půda                         | Plevle jednoleté                                                       | 2–3 l/ha<br>max. 200 l vody/ha | AT       | 1) po sklizni<br>4) max. 1× za rok                         |
| Orná půda                         | Pýr plazivý, plevle vytrvalé                                           | 3–5 l/ha<br>max. 200 l vody/ha | AT       | 1) po sklizni<br>4) max. 1× za rok                         |
| Jahodník                          | Plevle přerostlé                                                       | 1–2 l/ha<br>(33–50 % roztok)   | AT       |                                                            |
| Louky, pastviny                   | Obnova TTP                                                             | 3–6 l/ha<br>max. 200 l vody/ha | 21       |                                                            |
| Zavlažovací kanály                | Plevle pobřežní, nežádoucí dřeviny                                     | 5 l/ha<br>200–300 l vody/ha    | -        |                                                            |
| Železnice                         | Nežádoucí vegetace                                                     | 5–8 l/ha<br>max. 300 l vody/ha | -        | 4) max. 1× za rok                                          |
| Železnice                         | Nežádoucí vegetace                                                     | 4 l/ha<br>max. 300 l vody/ha   | -        | 4) max. 2× za rok                                          |
| Nezemědělská půda                 | Nežádoucí vegetace                                                     | 3–6 l/ha<br>max. 300 l vody/ha | -        | 4) max. 2× za rok                                          |
| Nezemědělská půda                 | Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevle - expandující druhy | 7–8 l/ha<br>300–400 l vody/ha  | -        | 4) aplikace plošná, max. 1× za rok                         |
| Nezemědělská půda                 | Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevle - expandující druhy | 4 %                            | -        | 4) bodová aplikace, max. 1× za rok                         |
| Lesní hospodářství - lesní školky | Buřeň                                                                  | 3–5 l/ha<br>200 l vody/ha      | -        | 4) max. 1× za rok                                          |



ROUNDUP® KLASIK PRO

Citlivost plevelů, které nejsou uvedené v rozhodnutí o povolení přípravků, nebyla vyhodnocena ÚKZÚZ z hlediska účinnosti, ale vyplývá ze zkušeností dosavadní agronomické praxe.

# Roundup® Klasik Pro

| Plodina                                                      | Škodlivý organismus                                | Dávkování                  | OL (dny) | Poznámka k<br>1) plodině<br>2) ŠO<br>3) OL<br>4) dávkování |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Lesní hospodářství<br>- lesní porosty                        | Plevele, nežádoucí dřeviny                         | 3–7 l/ha<br>200 l vody/ha  | -        | 4) max. 2x za rok                                          |
| Lesní hospodářství<br>- prořezávky a probírky                | Hubení výmladků,<br>potlačení pařezové výmladnosti | 15 % nátěr,<br>5 % postřik | -        | 4) nátěr, postřik,<br>max. 1x                              |
| Lesní hospodářství -<br>chemická příprava pro<br>obnovu lesa | Plevele, nežádoucí dřeviny                         | 3–7 l/ha<br>200 l vody/ha  | -        | 4) max. 1x za rok                                          |

OL - ochranná lhůta; AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

(-) - OL není nutné stanovit

| Plodina,<br>oblast použití                             | Dávka vody    | Způsob aplikace            | Max. počet aplikací v plodině                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| sady ovocné, aleje<br>a jiné porosty                   |               | nátěr, postřik             | 1x za rok                                                                       |
| jádroviny, peckoviny<br>(mimo broskvoň),<br>réva vinná | max. 200 l/ha | postřik                    | max. 2x za rok, při opakované<br>aplikaci do max. 8 l/ha za vegetační<br>sezónu |
| jahodník                                               |               | aplikace knotovým<br>rámem | 1x za rok                                                                       |
| lesní hospodářství                                     | 200 l/ha      | postřik                    | max. 2x za rok, při opakované<br>aplikaci do max. 8 l/ha za vegetační<br>sezónu |
| louky, pastviny                                        | max. 200 l/ha | postřik                    | 2x za rok, při opakované aplikaci<br>do max. 8 l/ha za vegetační sezónu         |
| nezemědělská půda                                      | 300–400 l/ha  | postřik                    | max. 2x za rok, při opakované<br>aplikaci do max. 8 l/ha za vegetační<br>sezónu |
| orná půda                                              | max. 200 l/ha | postřik                    | max. 2x za rok, při opakované<br>aplikaci do max. 8 l/ha za vegetační<br>sezónu |
| zavlažovací kanály                                     | 200–300 l/ha  | postřik                    | 1x za rok                                                                       |
| železnice                                              | max. 300 l/ha | postřik                    | 2x za rok (interval mezi aplikacemi<br>40 dnů)                                  |



# Roundup® Klasik Pro

**Menšinové použití přípravku povolené dle č. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009**

| Plodina         | Škodlivý organizmus                                                    | Dávka na ha    | OL (dny) | Poznámka k<br>1) plodině<br>2) ŠO<br>3) OL<br>4) dávkování |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Invazní dřeviny | Pajasan žláznatý (likvidace)                                           | 1–100 ml/strom | -        | 4) neředěný přípravek                                      |
| Invazní dřeviny | Trnovník akát,<br>javor jasanolistý,<br>javor pensylvánský (likvidace) | 1–100 ml/strom | -        | 4) min 50 % roztok nebo<br>neředěný přípravek              |

OL - ochranná lhůta; AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

| Plodina         | Dávka vody   | Způsob aplikace                                         | Max. počet aplikací<br>v plodině | Interval mezi<br>aplikacemi |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Invazní dřeviny | podle návodu | injektáž nebo aplikace<br>do záseků, aplikace<br>cílená | 2x za rok                        | 60–90 dnů                   |



ROUNDUP® KLASIK PRO

Citlivost plevelů, které nejsou uvedené v rozhodnutí o povolení přípravků, nebyla vyhodnocena ÚKZÚZ z hlediska účinnosti, ale vyplývá ze zkušeností dosavadní agronomické praxe.